

# 可舒炎 眼藥水

## Curzolan Eye Drops

### 【成分】 Each mL Contains :

Antazoline Hydrochloride ..... 0.5 mg  
Tetrahydrozoline Hydrochloride ..... 0.4 mg

賦形劑：Benzalkonium Chloride, Sodium Chloride, E.D.T.A.-2Na, HPMC, Distilled Water.

### 【特性與作用】《依文獻記載》

Tetrahydrozoline 是一種與 naphazoline 極為近似之擬交感神經作用劑，它藉由甲型腎上腺素刺激作用促使結膜小動脈收縮，進而舒解結膜之發炎與腫大症狀。Tetrahydrozoline 會造成眼壓些微下降。Antazoline 是 Curzolan 產品中的抗過敏活性成分，它可以與組織胺相互競爭，與效應細胞 (effector cells) 上的組織胺第一型接受器 H<sub>1</sub>-receptors 結合。組織胺進入組織中會造成滲透性上升、微血管擴張、平滑肌肉組織收縮、水腫、搔癢以及流淚，而 Antazolin 與組織胺第一型接受器之結合可以降低組織胺之作用。Curzolan 產品結合兩種活性成分，用以治療結膜之過敏症狀，這些症狀大多因組織胺釋出所引起。使用本產品會減輕流淚情況，但瞳孔直徑與調節作用及眼壓幾乎不受影響。

### 【藥物動力學】《依文獻記載》

目前尚無以人類或動物進行 Antazoline / Tetrahydrozoline 藥物動力特性之研究。Tetrahydrozoline 可以迅速產生療效，且藥效可以持續 4-8 小時之久。與他種甲型擬交感神經作用劑一致，Tetrahydrozoline 可以快速地進入血液循環系統並為全身所吸收。抗組織胺第一型藥劑 (Antazoline) 一般吸收速率快且吸收性相當好，但目前沒有吸收率之確實數據。

### 【適應症】

過敏性結膜炎、眼瞼緣炎、角膜炎。

### 【劑量/用法】

本藥須由醫師處方使用。  
急性發作期每隔 3 小時點 1 滴，做為維持療法每天 2-3 次，每次 1 滴。  
兒童每天 1-2 滴。

### 【使用限制】《依文獻記載》

#### 禁忌症：

- \* 對本品內含成分過敏。
- \* 因虹膜角之角度狹窄而導致青光眼之患者 (狹角性青光眼)，“乾眼”症候群患者。
- \* 兩歲以下幼童。

#### 隱形眼鏡配戴者請注意：

點用眼藥前請將隱形眼鏡取下，點藥後需間隔至少 15 分鐘才可再把隱形眼鏡戴上。Antazoline / Tetrahydrozoline 可能暫時性地減少淚液分泌，造成戴隱形眼鏡時之不適感。

#### 注意事項：

兒童必須審慎使用本產品。  
如出現慢性復發型過敏現象，請採用其他療法或藥品。  
本產品非屬長期用藥，若預期療程需超過 2-3 天，必須由醫師處方並進行追蹤檢查。  
乾性鼻炎患者應小心使用。由於本產品可產生全身性擬交感神經作用，糖尿病、嚴重心臟病、高血壓、甲狀腺機能亢進或嗜鉻細胞瘤患者使用本產品時須多加留意。

本產品可能會遮蔽眼部感染症狀。

於保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾淨的紗布擦拭後使用。

開瓶注意事項：產品於開啟使用前，先以順時針方式往下旋緊一圈後再逆時針轉開瓶使用，以利藥液滴出。

### 懷孕/哺乳婦女：

懷孕用藥等級：C

目前尚無以動物、懷孕婦女或嬰兒為對象之控制研究，因此只有當本產品之使用利益高於對胎兒或嬰兒之危險性時才得以使用本產品。Antazoline 或 Tetrahydrozoline 是否會進入母乳中目前仍不清楚。

### 【不良反應】《依文獻記載》

有時滴用本藥劑後會產生短暫而輕微之灼熱感，極少數人出現散瞳症。

停止用藥後可能會發生反應性充血症狀。少數病例出現頭痛、暈眩、心跳過速等情形，兒童患者尤是，另外也可能產生出汗、顫抖、血壓升高、焦躁及 pectanginous 症狀。

### 【藥物交互作用/不相容性】《依文獻記載》

本產品含有 Tetrahydrozoline，接受單胺氧化酵素抑制劑治療之患者必須於最後一次用藥 10 天後才可開始使用本產品 (單胺氧化酵素抑制劑與三環類抗憂鬱藥物併用會導致血壓升高)。

### 【過量使用】《依文獻記載》

遵循本產品之正確用法應不致於產生過量問題。成人誤食 Antazoline / Tetrahydrozoline 一般不會導致嚴重反應，但 2 歲以下幼兒如意外吞食則可能產生噁心、嗜睡、心律不整 / 心跳過快、甚至休克等症狀。

### 【其他資訊】

用後請立即拧紧瓶蓋，開瓶後超過一個月請丟棄勿用。  
如包裝保持完整，有效期限如包裝所示。

### 【儲存】

於 25°C 以下儲存，並置於孩童拿取不到之處。

### 【包裝】

100 毫升以下塑膠瓶裝。

衛署藥製字第 049334 號



委託者：麥迪森醫藥股份有限公司

台北市中正區林森南路十號五樓

製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠

桃園市桃園區桃鶯路 445-2 號

ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO., LTD.

No.445-2, Taoying Rd, Taoyuan Dist, Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)