

點特靈單劑量點眼液

BAXICIN SINGLE DOSE UNIT EYE DROPS

衛署藥製字第 037924 號
須由醫師處方使用

1. 性狀

1.1 有效成分及含量

每mL中含有Norfloxacin 3mg

1.2 賦形劑

Sodium Chloride、Sodium Acetate·3H₂O、E.D.T.A.(2Na)、
Hydrochloric Acid、Sodium Hydroxide、Distilled Water

1.3 劑型

眼用液劑。

1.4 藥品外觀

澄清無色近淡黃色溶液。

2. 適應症

對Norfloxacin具有感受性之感染症:眼瞼炎、麥粒腫、淚囊炎、結膜炎、
瞼板腺炎、角膜炎、術後感染症。

3. 用法及用量

3.1 用法用量

每天點眼3次，每次2~3滴(視情況增減用量)

4. 禁忌

下列患者請勿投與:對Norfloxacin或Quinolone系合成抗菌劑有過敏史。

5. 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 請勿長時間使用。

5.1.2 本劑不含任何防腐劑，不致對眼睛造成刺激，但若有不適，
仍請停止使用，並請教眼科醫師。

5.1.3 本劑開啟瓶蓋後，請立即使用完，不要貯藏。

5.1.4 請勿以手接觸滴瓶口，以避免污染。

5.1.5 請勿置於小孩可拿取處。

5.2 其他注意事項

僅用於點眼使用。

6. 特殊族群注意事項

目前無資料。

7. 交互作用

目前無資料。

8. 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1 過敏症:若有過敏症狀時，請停止投與。

8.1.2 其他:偶有刺激等症狀，或引起卡他性結膜炎，但極少發生。

9. 過量

目前無資料。

10. 藥理特性

10.1 作用機轉

Norfloxacin 抑制細菌 DNA 促旋酶(DNA gyrase)，對大多數革蘭
氏陰性菌和革蘭氏陽性菌具有廣譜抗菌活性。

10.2 藥效藥理特性

點特靈點眼液為一次使用一支之單劑量包裝眼藥水，可免除多人
多次使用一瓶而造成眼疾交互感染之危險。點特靈點眼液為單劑
量使用包裝，故不含防腐劑，可避免防腐劑對眼睛之刺激。本劑
係 Fluoroquinolone 系合成抗菌劑，含有Norfloxacin之廣效性抗菌
點眼劑。

10.3 臨床前安全性資料

目前無資料。

11. 藥物動力學特徵

目前無資料。

12. 臨床試驗資料

目前無資料。

13. 包裝及儲存

13.1 包裝

0.5毫升單一劑量塑膠瓶裝。

13.2 效期

2年

13.3 儲存條件

13.3.1 儲存於25°C以下

13.3.2 請放置於陰涼處，以避免日光照射。

14. 病人使用須知

14.1 旋轉上瓶蓋即可輕易開啓。

14.2 為要易於押出藥液故每支均裝入稍微多量，每支使用後剩餘之
藥液請務必丟棄。

14.3 每支容器為醫藥品級純PE塑膠，無毒，可分解，可完全燃燒而
不產生有毒氣體。



製造廠

麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠 | 桃園市桃園區桃鶯路445之2號

藥商

麥迪森醫藥股份有限公司 | 臺北市中正區林森南路10號5樓