

利視明 眼藥水

Lixamin Eye Drops

【成分】

每mL中含有：

Dexamethasone Phosphate(sodium).....1.0mg

Neomycin Sulfate.....5.0mg

(equivalent to Neomycin Base.....3.5mg)

賦形劑：HPMC-606, Sodium Citrate Dihydrate, D-Mannitol, Menthol, Boric Acid, Sodium Borate, Sodium Chloride, Alcohol, Distilled Water.

【適應症】

角膜炎、流行性結膜炎、淚囊炎、紫外線引起之眼炎、急慢性結膜炎、化膿性結膜炎。

【用法·用量】

本藥須由醫師處方使用。

一日點用二~三次，每次二~三滴，可視情形酌量增減。

【注意事項】

1. 點用時注意勿使容器尖端觸及眼眶，方可保持藥劑之清淨。
2. 需有適當之抗菌治療，始可使用於細菌感染之病例。
3. 若遇頑治之前眼部疾患或深部眼疾患時，須合併用腎上腺皮質內分泌全身性治療。
4. 一般遺傳性及退化性眼疾患對於本劑無效。
5. 眼之結核症及單純性疱疹乃本劑之禁忌症。
6. 對於治療眼色素層炎，特別是慢性者，有時會引起眼壓增高，應予注意。
7. 開瓶注意事項，產品於開啟使用前，先以順時針方向往下旋緊一圈後再逆時針旋轉開瓶使用，以利藥液滴出。
8. 於保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾淨的紗布擦拭後使用。

【儲存】

請儲存於25°C以下，並避免陽光及日光燈直射，不要置於高溫度環境或冰箱中，瓶蓋應蓋緊。

須置於小孩接觸不到之處。

【包裝】

100mL以下塑膠瓶裝。

內衛藥製字012342號



委託者：麥迪森醫藥股份有限公司

台北市中正區林森南路十號五樓

製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠

桃園市桃園區桃鶯路445-2號

ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO.,LTD.

No.445-2, Taoying Rd, Taoyuan Dist, Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

5A49⑤