

“麥迪森” 克壓 眼藥水 0.25%  
**Timolol Eye Drops 0.25% “MEDICINE”**

**【成分】**

每毫升含：

**Timolol (maleate) .....2.5mg**

賦形劑：HPMC-606, Benzalkonium Chloride, Sodium Chloride,  
Sodium Phosphate Dibasic 12H<sub>2</sub>O, Sodium Phosphate  
Monobasic 2H<sub>2</sub>O, Distilled Water

**【特性】**

Timolol眼藥水可降低高眼壓或青光眼之眼內壓。點用後約20分鐘開始產生降眼壓作用，在1~2小時內達最大降壓效果。Timolol 0.25%、0.5%眼藥水可24小時有效的降低壓。Timolol Maleate為非選擇性Beta腎上腺素阻斷劑。本品對心肌不具體內類交感神經刺激作用，也不具局部麻醉活性(細胞膜安定作用)。Timolol眼藥水降眼壓之機轉尚未確立，可能與減少房水的生成有關。臨床分析顯示 Timolol眼藥水可降低正常或升高之眼內壓，不會改變瞳孔大小或視覺敏銳性。長期使用仍能保有治療活性。通常，其耐受性較Pilocarpine及Adrenaline佳。研究顯示Timolol眼藥水並不常發生副作用，若有也只是輕微。

**【適應症】**

青光眼、高眼壓症。

**【用法·用量】**

本藥須由醫師處方使用。

1. 撥開眼瞼，將本品滴於結膜囊內。
2. 0.25%一日二次，一次一滴；或效果不佳時，可改用0.5%一日二次，一次一滴。若本產品尚不足控制患者眼內壓時，可併用縮瞳劑、Epinephrine或Carbonic anhydrase inhibitors。若治療效果佳，許多病患可控制維持劑量為一天一次，一次一滴。
3. 為避免汙染，請勿接觸瓶口；使用後請將瓶蓋蓋好。

**【注意事項】**

1. 以Timolol取代目前使用之青光眼治療藥品時，應在第一天加點Timolol(如前述劑量標準)，第二天則停用其他藥品，單獨使用Timolol。
2. 若Timolol與其他藥品併用時，也須投與前述之劑量標準。併用藥品時應調整各別治療劑量，以維持適當控制眼內壓。
3. Timolol的作用發揮可長至四星期才穩定，故在此期間再評估眼壓之前，應予考慮此因素。因為眼壓每日變化不同，應於一天中之不同時段測量眼壓。
4. 懷孕期間使用的安全性尚未被確立。對於那些可能有潛在危機的患者，應限制使用Timolol。
5. 尚未對兒童進行臨床研究，故不建議兒童使用本品。

**【警告】**

1. 某些患者使用眼用Timolol，可能引起類似全身性投與Beta阻斷劑之副作用，對全身性投與Beta阻斷劑有禁忌的患者使用本品時應予以注意。這先患者包括：支氣管性氣喘、竇房結性心跳徐緩、心臟性休克、暫時性糖尿病及一級高度房室傳導阻斷。
2. 心官能不足之患者在治療之前應適當的調補。有嚴重心臟病史患者應定期檢查，觀察脈搏速率及可能發生充血性心官能不足之徵兆。
3. 同時使用口服Beta阻斷劑的病患，可能會有對降眼壓及全身性作用產生加成反應。

4. 局部性給藥亦可能發生如下副作用：嚴重的呼吸反應及心臟反應，包括在全身性或眼部Timolol Maleate給藥後，有氣喘患者因氣管痙攣而死亡及少數與心臟衰竭有關之死亡案例。

#### 【禁忌症】

對Timolo過敏患者。

Timolol Maleate對於患有氣喘或有氣喘病史或慢性阻塞性肺部疾患病症者禁用。

#### 【交互作用】

可能有全身性Beta阻斷劑的效應(請參看警告)。

對併用Epinephrine的病患可能會產生散瞳反應。單獨使用Timolol不會改變瞳孔大小。

#### 【副作用】

1. 耐受性通常令人滿意。偶有眼部刺激的徵狀出現，包括：結膜炎、眼瞼炎、角膜炎。有時會產生視覺改變，包括折射力改變，可能與停用先前使用的散瞳劑有關。
2. 偶有過敏反應，蕁麻疹或局部、全身性發疹。
3. 少有全身性Beta阻斷劑反應(參看警告)發生的報告，其中包括：輕度心跳徐緩、低血壓、支氣管痙攣(特別是有氣喘病史的病人)，充血性心官能不全及對胰島素依賴性糖尿病患者的低血糖症狀產生遮蔽作用。
4. 下列副作用可能發生但未確定與本品治療有直接關係：頭痛、口乾、食慾不振、視覺障礙、噁心、心悸、高血壓、無晶狀體囊狀斑水腫以及中樞神經性效應(疲勞、神智混淆、抑鬱、焦慮、嗜睡)。

#### 【不相容性】

未知。

#### 【用藥過量及處理】

局部使用建議劑量並不會發生毒性。因意外或大量攝取可能會發生噁心及其他心血管循環障礙，應依使用量而給與全身性治療。

#### 【其他注意事項】

1. 於保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾淨的紗布擦拭後使用。
2. 開瓶注意事項:產品於開啟使用前，先以順時針方式往下旋緊一圈後再逆時針轉開瓶使用，以利藥液滴出。

#### 【保存條件】

請儲存於25°C以下，避光儲存。

須置於小孩接觸不到之處。

#### 【包裝】

100mL以下塑膠瓶裝。

衛署藥製字第048195號



委託者：麥迪森醫藥股份有限公司  
台北市中正區林森南路十號五樓  
製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠  
桃園市桃園區桃鶯路445-2號  
ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO.,LTD.  
No.445-2, Taoying Rd, Taoyuan Dist, Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

5A05⑤