

單劑量包裝一次使用一支

**眼明** 眼藥水0.25%、0.5%  
**Anme Eye Drops 0.25%、0.5%**  
(Timolol)

單劑量包裝使用 • 不產生交互感染 • 不含防腐劑

眼明眼藥水為一次使用一支之單劑量包裝眼藥水，可免除多人多次使用一瓶而造成眼疾交互感染之危險。眼明眼藥水為單劑量使用包裝，故不含防腐劑，可避免防腐劑對眼睛之刺激。

**【藥效】**

Timolol眼藥水，可降低升高及正常之眼壓，Timolol之作用時間快，外用滴眼20分鐘後即發生作用，可於1-2小時，發生最大降壓效果，維持顯著降低眼壓作用，可長達24小時。Timolol不會產生眼之局部麻醉作用。

Timolol Maleate是一種非選擇性乙型腎上腺素激導性接受器阻斷劑，它沒有顯著的交感神經興奮，心肌抑制，或局部麻醉作用。

Timolol降低眼壓之確實機轉仍不明，雖然螢光及壓力描記研究顯示它的主要作用，與降低眼房水形成有關。另外有的研究發現在流出通暢方面有輕度增加。

Timolol降低眼壓時不像縮瞳劑會影響瞳孔大小，或由於增加調節作用而影響視力，因此較不會有視力模糊，陰暗及夜盲等縮瞳劑之副作用。另外白內障患者可避免因瞳孔縮小時，而失去水晶體污濁週圍觀看之能力。臨床研究顯示，Timolol對於大多數患者都有效，而且比Pilocarpine或Epinephrine產生較少及較輕微之副作用。

本品適用於下列病人以降低眼壓：

- ◎眼壓增高之患者
- ◎患有青光眼無晶狀體之患者，包括戴有隱形眼鏡之患者
- ◎續發性青光眼患者
- ◎患有窄角及於對側眼由於自然發生或由於醫療而引起的窄角閉鎖患者（但不可單獨使用Timolol治療窄角性青光眼）

**【成份】**

每mL含有：Timolol (as Maleate) ..... 2.5 mg  
每mL含有：Timolol (as Maleate) ..... 5.0 mg  
賦形劑：Sodium Phosphate Dibasic 12H<sub>2</sub>O, Sodium Phosphate Monobasic 2H<sub>2</sub>O, Sodium Chloride, Distilled Water.

**【適應症】**

青光眼。

**【用法及用量】**

1. 旋轉上瓶蓋即可輕易開啟。
2. (1)0.25%溶液，一次一滴，一天二次，如果臨床效果欠佳，改用0.5%溶液，一次一滴，一天二次，如果眼壓已經保持到理想的程度，可改用每天只滴一次即可。由於白天常發生自然之眼壓變化，所以每天應在不同的時間，測定眼壓，以決定是否產生理想的效果。
- (2)臨床試驗顯示，對於應用最大抗青光眼療效欠佳之患者，如果加上本品時，則有良好之效果，如果需要再進一步控制眼壓時，可同時應用縮瞳藥Epinephrine及全身服用Carbonic anhydrase 抑制劑。
- (3)當患者欲從其它抗青光眼藥物改用本品時，於第一天，以前應用的藥物維持不變，再滴一滴0.25%溶液，一天二次。第二天停止使用以前之抗青光眼藥，而用本品繼續之。如果需要高劑量本品

時，可改用0.5%溶液，一次一滴，一天二次。如本品想要加到其它抗青光眼療法上時，可用0.25%溶液一滴，一天二次，如需高劑量本品時，可改用0.5%溶液一滴，一天二次。

3. 為易於壓出藥液故每支均裝入稍微多量，每支使用後剩餘之藥液請務必丟棄。
- 每支容器為醫藥品級純PE塑膠，無毒。
- 本藥須由醫師處方使用。

**【使用上的注意】**

1. 本劑不含任何防腐劑，不致對眼睛造成刺激，但若有不適，仍請停止使用，並請教眼科醫師。
2. 本劑開啟瓶蓋後，請立即使用，不要貯藏。
3. 請勿以手接觸滴瓶口，以避免污染。
4. 請放置於陰涼處，以避免日光照射。
5. 請勿置於小孩可拿取處。

**【警語】**

局部性給藥亦可能發生如下副作用：嚴重的呼吸反應及心臟反應，包括在全身性或眼部Timolol Maleate給藥後，有氣喘患者因氣管痙攣而死亡及少數與心衰竭有關之死亡案例。

**【注意事項】**

Timolol眼藥水於已知禁忌全身應用乙型腎上腺素激導性接受器阻斷劑之患者，例如氣管痙攣疾病及充血性心臟衰竭患者，用時宜小心。對於長期使用本藥之青光眼患者應特別注意，每三個月應接受複檢，以免發生不良後果。

**【副作用】**

有引起角膜表層性角膜炎，角膜失去知覺，瞳孔括約肌麻痺之虞，Timolol眼藥水，通常耐受性極佳，偶而發生眼內刺激之報告，偶有發現患者有輕微心節律減低（平均每分鐘減低2.9次，標準偏差10.2），局部過敏反應，很少發生。

**【禁忌】**

- (1)對Timolol眼藥水過敏者。
- (2)Timolol Maleate對於患有氣喘或有氣喘病史或慢性阻塞性肺部疾患病症者禁用。
- (3)心衰竭。
- (4)竇性心跳徐緩。

**【孕婦之應用】**

Timolol眼藥水對於懷孕，尚未進行研究，應用本品時，須衡量所得之益處及其可能帶來之危險。

**【小兒之應用】**

由於小兒尚未進行臨床試驗，故暫不主張用於小兒。

**【儲存】**

儲存於室溫25°C以下，避光貯存。

**【包裝】**

100公撮以下塑膠瓶裝。

眼明0.25% 衛署藥製字第039034號

眼明0.5% 衛署藥製字第039033號

製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠  
桃園市桃園區桃鶯路 445-2 號  
ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO., LTD.  
1F, No.445-2, Taoying Rd., Taoyuan Dist,  
Taoyuan City 330, Taiwan(R.O.C)

5A34 ④