

# “麥迪森”眼亮 眼藥水0.5%

**Better Eye Drops 0.5% (Tropicamide)**

## 【優點】

- (1) 於滴後約20~25分鐘，即可達到最大之散瞳及睫狀肌麻痺作用，可保持效果約15分鐘，如欲維持睫狀肌麻痺作用時，於20~30分鐘後，可再滴一滴。
- (2) 恢復快，可使患者很快離開醫師診室，於2~4小時內，可恢復眼之調節功能，通常於6小時內可完全恢復，無需藉助縮瞳劑，如應用縮瞳劑時，則恢復更快。
- (3) 本品不論虹膜之顏色如何都有效。
- (4) 為特殊不同目的，有二種濃度之選擇：0.5%係為散瞳作用(具有適度短效睫狀肌麻痺作用)，1%為希望最大睫狀肌麻痺效果時應用之。

## 【成分】

Each mL contains:

**Tropicamide.....5mg**

賦形劑：Benzalkonium Chloride 50% Solution, Hydrochloric Acid, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Distilled Water

## 【適應症】

散瞳及睫狀肌麻痺。

## 【用法·用量】

本藥限由醫師使用。

用於檢查眼底—於檢查前15~20分鐘，將0.5%藥水滴入一滴或二滴即可。

## 【禁忌】

勿用於房角狹窄性青光眼(narrow angle glaucoma)。

## 【注意】

1. 與任何其他之散瞳劑同，當眼壓增高或眼壓不明或眼內前房淺時用時宜注意。於驗光(屈光)，需要睫狀肌麻痺作用延長時，只需要另外附加一滴即可。
2. 配戴隱形眼鏡時不可使用本藥。使用本藥後，至少間隔15分鐘才能配戴隱形眼鏡。本藥可能使隱形眼鏡脫色。
3. 開瓶注意事項，產品於開啟使用前，先以順時針方向往下旋緊一圈後再逆時針旋轉開瓶使用，以利藥液滴出。
4. 於保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾淨的紗布擦拭後使用。

## 【副作用】

有時可能發生暫時性刺痛感。

## 【儲存】

請儲存於25°C以下，並避免陽光及日光燈直射，不要置於高溫度環境或冰箱中，瓶蓋宜蓋緊。

須置於小孩接觸不到之處。

## 【包裝】

100mL以下塑膠瓶裝。

衛署藥製字第047291號



委託者：麥迪森醫藥股份有限公司

台北市中正區林森南路十號五樓

製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠

桃園市桃園區桃鶯路445-2號

**ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO.,LTD.**

No.445-2, Taoying Rd, Taoyuan Dist, Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

5A02⑦