

100\*205mm

“麥迪森”亞妥明 眼藥水0.125%

**Atropine Eye Drops 0.125% “MEDICINE”**  
(Atropine Sulfate)

**【說明】**

本品是一種無菌使用於眼部之局部抗乙酰膽胺作用劑。

**【成份】**

Each ml contains:  
Atropine Sulfate.....1.25mg  
賦形劑：Sodium Chloride, Sodium Phosphate Dibasic  
12H<sub>2</sub>O, Sodium Phosphate Monobasic 2H<sub>2</sub>O,  
HPMC, Distilled Water

**【臨床藥理】**

本品是一種 anticholinergic 劑，由節後膽鹼神經直接作用於平滑肌和淚腺，它們的藥理作用是由於阻止乙酰膽胺的類副交感神經作用。

**【適應症】**

散瞳、睫狀肌麻痺。

**【禁忌】**

1. 本品不能用於青光眼，或者有窄角性青光眼傾向之病人。
2. 本品不能用於先前對 atropine 產生嚴重全身反應之小孩。

**【警告】**

過量使用於小孩和對某特定過敏體質者，可能會產生全身中毒症狀時，應停止使用和使用適當藥物，如述於“過量”部分治療。

**【注意事項】**

本品應置於小孩拿不到的地方。

**【致癌性、突變性、不孕症】**

還沒有產生這些病例之研究報告。

**【懷孕婦女】**

1. 本品還未做動物生殖研究，也不知道是否能夠造成胎兒傷害，或影響生殖能力。
2. 本品可應用於孕婦（僅當清楚需要時）。

**【幼兒】**

請看禁忌和警告部分。

**【副作用】**

1. 長久使用時可能引起全身反應，眼瞼過敏反應，局部刺激、充血、腫大、結膜濾泡增殖炎或者皮膚炎。
2. 使用時，會有畏光及近距離調節力不足之現象。

**【過量】**

一般症狀和 atropine 中毒症狀，包括：口乾、皮膚過敏、發燒、精神錯亂、心悸、臉部發紅，如果有過量現象，應使用水或 0.9% 食鹽水沖洗，必要時可用縮瞳劑。

如果意外攝取時（吞食時）：

- (1) 使用 4% 單寧酸使之嘔吐或洗胃。

(2) 使用 5mg 之毛果芸香鹼 (Pilocarpine) 口服直至口濕潤為止(必要時間隔投與)。

假如需要全身支持措施時：如下表

- (1) 呼吸衰竭時：氧氣筒和人工呼吸。
- (2) 尿液滯留時：插入導管導尿。
- (3) 發燒：用酒精擦拭。

當用於已用短作用之 Barbiturates 鎮靜劑為控制刺激 (Excitement) 狀態時，須非常小心。

**【劑量及使用方法】**

- A. 用於睫狀肌麻痺性折射（屈光）時：  
局部用於結膜，1天1~2次，每次1滴。  
(1) 嬰兒（大至1歲）：使用濃度：0.125%，或由醫師指示使用。  
(2) 小孩（1至5歲）：使用濃度：0.25%，或由醫師指示使用。  
(3) 小孩（5歲和大於5歲，且是藍虹膜者）：使用濃度：0.25%，或由醫師指示使用。  
(4) 小孩（5歲和大於5歲，且是暗虹膜者）：使用濃度：0.5%或1%，或由醫師指示使用。
- B. 用於葡萄膜炎時：局部用到結膜，使用濃度：0.125%至1%，1天1~3次，每次1滴。
- C. 用於手術後瞳孔放大時：局部用到結膜，使用濃度：0.5%或1%，1天1~3次或由醫師決定，每次1滴。
- D. 本藥限由醫師使用。

**【包裝貯存】**

0.5 ml、1 ml 塑膠瓶裝。  
請儲存於室溫25℃以下，避免陽光直射。

衛署藥製字第049620號

製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠  
桃園市桃園區桃鶯路445-2號  
**AIM** ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO., LTD.  
No.445-2, Taoying Rd., Taoyuan Dist.,  
Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C)

5A12 ③