

# “麥迪森”亞妥明眼藥水0.01%

“AIM” Atropine Eye Drops 0.01%

衛部藥製字第 059755 號  
須由醫師處方使用

本品不含防腐劑(如：Benzalkonium chloride)，不產生交互感染，是一種無菌使用於眼部之局部抗膽鹼劑。

## 1. 性狀

### 1.1 有效成分及含量

每mL中含有Atropine Sulfate 0.1mg

### 1.2 賦形劑

HPMC-606、Sodium Chloride、Boric Acid、Sodium Borate、  
Hydrochloric Acid、Distilled Water

### 1.3 劑型

眼用液劑。

### 1.4 藥品外觀

透明澄清無色溶液。

## 2. 適應症

散瞳及睫狀肌麻痺。

## 3. 用法及用量

### 3.1 用法用量

通常一次1~2滴	一天1~4次
----------	--------

視症狀酌於增減，限由醫師處方使用。

## 4. 禁忌

4.1 有青光眼或有導致狹角性青光眼傾向之患者禁止用本品。

4.2 曾因本藥成分引起過敏的人請勿使用本藥。

## 5. 警語及注意事項

### 5.1 警語/注意事項

5.1.1 過量使用於小孩或對特定成分過敏者，可能會產生全身中毒症狀，應停止使用並以適當藥物治療，參見【過量】段落。

5.1.2 使用後會產生視力模糊，應避免駕駛汽機車。

5.1.3 本藥為可回蓋式(re-cap)不含防腐劑拋棄式小包裝眼藥水，需於24小時內使用完畢。

5.1.4 使用前，請洗淨雙手。

## 6. 特殊族群注意事項

### 6.1 懷孕

Atropine Sulfate尚未有動物生殖研究，目前尚未清楚局部Atropine Sulfate是否會對胎兒造成傷害或影響生殖能力。僅當清楚需要時，本品可應用於孕婦。

### 6.2 哺乳

目前無資料。

### 6.3 有生育能力的女性與男性

目前無資料。

## 6.4 小兒

請參見禁忌和警語及注意事項段落。

## 7. 交互作用

目前無資料。

## 8. 副作用/不良反應

### 8.1 臨床重要副作用/不良反應

使用時，可能會產生畏光及近距離調節作用不足之現象。曾有發生眼瞼過敏反應、局部刺激、充血、腫大、結膜濾泡增殖炎或皮膚炎的報告。

## 9. 過量

全身性atropine中毒症狀，包括臉部潮紅、皮膚乾燥（小孩可能會出現紅疹）、視力模糊、心跳加快與心跳不規律、發燒、腹脹、便秘、譫妄、神經肌肉不協調、年紀大者會精神恍惚、長期散瞳。如有過量現象，應使用水或0.9%生理食鹽水沖洗。如意外攝取（吞食）時，可使之嘔吐或洗胃，必要時需全身支持措施和靜脈注射毒扁豆鹼(physostigmine)治療。

## 10. 藥理特性

### 10.1 作用機轉

目前無資料。

### 10.2 藥效藥理特性

目前無資料。

### 10.3 臨床前安全性資料

目前無資料。

## 11. 藥物動力學特徵

目前無資料。

## 12. 臨床試驗資料

目前無資料。

## 13. 包裝及儲存

### 13.1 包裝

0.5mL LDPE瓶裝。

### 13.2 效期

2年

### 13.3 儲存條件

13.3.1 請儲存於25°C以下，避免陽光及日光燈直射。

13.3.2 需置於小孩接觸不到之處。

## 製造廠

麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠	桃園市桃園區桃鶯路445之2號
-----------------	-----------------

## 藥商

麥迪森醫藥股份有限公司	臺北市中正區林森南路10號5樓
-------------	-----------------