

110*254mm

單劑量包裝 一次使用一支

“麥迪森”

富適

點眼液 1毫克/毫升

FUSONE EYE DROPS 1 mg/mL "Medicine" (Betamethasone)

單劑量包裝使用，不產生交互感染，不含防腐劑

“麥迪森”富適點眼液為一次使用一支之單劑量包裝眼藥水，可免除多人多次使用一瓶而造成眼疾交互感染之危險。

“麥迪森”富適點眼液為單劑量使用包裝，故不含防腐劑，可避免防腐劑對眼睛之刺激。

【成分】每mL中含有：


Betamethasone Disodium Phosphate 1mg

賦形劑：Sodium Chloride, Sodium Phosphate Dibasic,
Sodium Phosphate Monobasic, Distilled Water

【適應症】眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、虹彩炎等之炎症性眼科疾患、手術後炎症。

【用法·用量】

- ①旋轉上瓶蓋即可輕易開啓。
- ②每天點眼3~4次，每次1~2滴（視情況增減用量）。
- ③為要易於押出藥液故每支均裝入稍微多量，每支使用後剩餘之藥液請務必丟棄。
 - 每支容器為醫藥品級純PE塑膠，無毒，可分解，可完全燃燒而不產生有毒氣體。
 - 本藥須由醫師處方使用。



【使用上的注意】

- 1.本劑不含任何防腐劑，不致對眼睛造成刺激，但若有不適，仍請停止使用，並請教眼科醫師。
- 2.本劑開啓瓶蓋後，請立即使用完，不要貯藏。
- 3.請勿以手接觸滴瓶口，以避免污染。

【注意事項】

- 1.曾對本劑成分引起過敏之患者請勿使用。
- 2.角膜潰瘍患者，濾過性病毒性結膜、角膜疾患、結核性眼疾患，真菌性眼疾患及化膿性眼疾患者，以不使用本劑為原則，若需使用本劑時，應慎重使用。
- 3.勿長時間連續使用，若有過敏症狀發生，應即停藥。
- 4.孕婦或可能已懷孕之婦人應避免長期頻繁使用。
- 5.未滿2歲之嬰幼兒應慎重使用。
- 6.連續使用數週後，偶有眼內壓亢進，青光眼等現象，應定期實施眼內壓檢查。
- 7.有時會誘發角膜疱疹、角膜真菌症、綠膿菌感染症等，應即施以適當處理。
- 8.長期使用，偶會出現後囊白內障。

【儲存】

請儲存於25°C以下，並避免陽光及日光燈直射，不要置於高溫環境或冰箱中。
須置於小孩接觸不到之處。

【包裝】20mL以下塑膠瓶裝

衛署藥製字第036654號 G-3687

製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠

桃園市桃園區桃鶯路 445-2 號

AIM ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO., LTD.

No.445-2, Taoying Rd., Taoyuan Dist.

Taoyuan City 330, Taiwan(R.O.C)

5A17⑤