

“麥迪森”
得視隆眼藥水 0.1%

Desalone Eye Drops 0.1% “MEDICINE”
(Dexamethasone Phosphate)

Dexamethasone為一種合成之副腎皮質荷爾蒙，有抗炎症作用及抗過敏作用，直接作用於微血管壁及細胞膜，減低滲透性，抑制白血球在炎症部之集合，又對細胞 Lysosome 膜有保護作用，防止細胞自己溶解。

副腎皮質荷爾蒙在眼科疾病治療上的價值，素為醫學界所公認，從臨床上的經驗證明，Dexamethasone在局部使用時其抗炎症作用的強度為 Prednisolone之 4-6 倍，而為Hydrocortisone之25-30倍以上。本劑對於很多眼睛的感染、過敏性反應、外傷及手術後之種種情況具有治療作用。

【成分】

每mL中含有：

Dexamethasone Phosphate.....1.0 mg
(Equivalent to Dexamethasone Sodium Phosphate.....1.09mg)
賦形劑：EDTA-2Na, Menthol, Boric Acid, Sodium Borate,
Bezalkonium Chloride, Alcohol, Sodium Hydroxide,
Hydrochloride Acid, Distilled Water.

性狀·劑型：無色透明液（無菌製劑）

【適應症】

敏感性睑緣炎、非特異性表層角膜炎、深部角膜炎、帶狀疱疹眼炎、水泡性角膜結膜炎、虹彩毛樣體炎、虹彩炎。

【用法·用量】

本藥須由醫師處方使用。
每日點眼二至四次，每次1~2滴。

【注意事項】

1. 本品係含類固醇(Corticosteroid)製劑，長期使用可能引起：
 - (1) 眼壓增高
 - (2) 視機能減退
 - (3) 後囊下內障(Posterior Subcapsular Cataracts)
2. 長期使用局部類固醇可能會造成眼內壓升高和白內障，故連續使用本劑兩星期以上時建議能做眼壓及裂隙燈檢查。
3. 青光眼患者使用局部類固醇製劑或本劑時需檢查眼壓，如有過高應立即停藥。
4. 於保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾定的紗布擦拭後使用。
5. 開瓶注意事項: 產品於開啟使用前，先以順時針方向往下旋緊一圈後，再以逆時針方向轉開始用，以利藥液滴出。

【儲存】

1. 請儲存於25°C以下，置於陰涼避光處。
2. 須置於小孩接觸不到之處。

【包裝】

100毫升以下塑膠瓶裝。
衛署藥製字第057904號



委託者：麥迪森醫藥股份有限公司
台北市中正區林森南路十號五樓
製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠
桃園市桃園區桃鶯路 445-2 號
ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO., LTD.
No.445-2, Taoying Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C)

5A32⑤