

口樂漱口液0.12% Corol Oral Rinse Solution 0.12%

衛部成製字 第016842號
乙類成藥

1. 成分

1.1 有效成分及含量

Each mL Contains :

Chlorhexidine Gluconate 20%.....6mg
(as equivalent to Chlorhexidine Gluconate.....1.2mg)

1.2 其他成分(賦形劑)

Glycerin、Propylene Glycol、Cyclamate Sodium、Sodium Saccharin、Sorbitol Solution 70%、PEG-40 Hydrogenated Castor Oil、Alcohol 95%、Blue No.1、Peppermint Oil、Sodium Hydroxide、Water Purified。

2. 用途(適應症)

口腔內之殺菌、消毒、清潔、去除口臭。

3. 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 未滿6歲。

3.1.3 口腔潰瘍的人

3.2 其他使用上注意事項

3.2.1 本藥僅供漱洗不可吞服。

3.2.2 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.2.3 6歲以上12歲以下兒童需在大人指導下使用。

3.2.4 本藥含酒精2.85%，宜審慎使用。

3.2.5 使用後30分鐘內請勿進食、吸煙或服用飲料。

4. 用法用量

用法	用量
漱口水劑於口腔內漱洗並停留30秒至60秒後吐出，可於早晚或需要時使用。	每次10mL

5. 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
口腔及喉部	灼熱感及刺痛感

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
如不慎過量使用及吞服後，感覺不適的人。

6. 包裝

6.1 製造廠-麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠

10毫升塑膠瓶裝

6.2 製造廠-榮民製藥股份有限公司

10毫升鋁箔包裝、500毫升以下、4000毫升塑膠瓶裝。

7. 儲存方式

7.1 請勿變換容器，避免誤服。

7.2 避免陽光直射

7.3 室溫25°C以下。

8. 藥物動力學

使用Chlorhexidine Gluconate 0.12%漱口液時，會有30%的有效成分慢慢的釋出於漱口液中，而作用於口腔粘膜。

由人和動物的研究：Chlorhexidine Gluconate在胃腸道的吸收不好，若不慎服用，於12小時後約有90%的有效成分會從糞便中排出。

製造廠

麥迪森醫藥股份有限公司桃園廠	桃園市桃園區桃鶯路445之2號
榮民製藥股份有限公司	桃園市中壢區中山東路3段447號

藥商

麥迪森醫藥股份有限公司	臺北市中正區林森南路10號5樓
-------------	-----------------

廠商內部文件編號：5A33-8