

# 麥迪森人工淚液

## AIM ARTIFICIAL TEARS

衛署藥製字第 038990 號  
醫師藥師藥劑生指示藥品

麥迪森人工淚液為拋棄式單支小包裝，可避免一般瓶裝式人工淚液重複使用所造成眼睛之感染，且不含防腐劑。

麥迪森人工淚液適用於長時間在冷氣房工作的上班族、長時間開車的駕駛人、隱形眼鏡族、學生、文字工作者、電腦工作者……等，能舒緩眼睛乾澀及異物感。

### 1 成分

#### 1.1 有效成分及含量

每mL含有主成分：

**Sodium Chloride.....5.5mg**

**Potassium Chloride.....1.5mg**

#### 1.2 其他成分(賦形劑)

Sodium Borate、Boric Acid、Distilled Water

### 2 用途(適應症)

暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

### 3 使用上注意事項

- 3.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 3.2 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.3 使用前，請洗淨雙手。
- 3.4 請依照藥品標示使用。
- 3.5 過期眼藥水，請勿使用。
- 3.6 藥液混濁、變色或出現異物時，請丟棄。
- 3.7 為避免汙染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口。並避免與他人共用，或以其他容器承裝。
- 3.8 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上。
- 3.9 對本藥之主要成分或其他賦形劑過敏者，不建議使用。
- 3.10 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。

### 單劑式產品使用說明



**1** 輕輕旋轉上瓶蓋即可開啟



**2** 視情況需要適量使用



**3** 須於24小時內使用完畢

#### 4 用法用量

需要時使用	每次1至2滴
-------	--------

#### 5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.1.1 連續使用三天(或72小時)症狀未解除。

5.1.2 使用後產生眼睛劇痛，持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。

5.1.3 發生過敏反應。

#### 6 包裝

100毫升以下塑膠瓶裝。

#### 7 儲存方式

請儲存於25°C以下，並避免陽光及日光燈直射，不要置於高溫環境或冰箱中。須置於小孩接觸不到之處。



#### 製造廠

麥迪森醫藥股份有限公司桃園廠	桃園市桃園區桃鶯路445之2號
----------------	-----------------

#### 藥商

麥迪森醫藥股份有限公司	臺北市中正區林森南路10號5樓
-------------	-----------------

廠商內部文件編號:5A48-4